Supplementary Table 1. Trimester-based comparison of inflammatory markers and complication rates in pregnant patients with acute appendicitis

Variable	1st Trimester (n=22)	2nd Trimester (n=36)	3rd Trimester (n=9)	p-value
Non-complicated acute appendicitis (n, %) **Complicated (n, %)**	17 (77.3%) 5 (22.7%)	28 (77.8%) 8 (22.2%)	5 (55.6%) 4 (44.4%)	0.416*
CRP (mg/L), median (min-max)	13.0 (0.1-230.0)	14.5 (1.0-170.0)	18.2 (7.0-102.0)	0.285
CAR, median (min-max)	0.31 (0.00-5.90)	0.33 (0.05-3.40)	0.46 (0.19-1.80)	0.221
NLR, median (min-max)	6.52 (1.54-23.58)	6.90 (2.05-27.45)	8.10 (3.43-20.80)	0.372
SII, median (min-max)	3.41 (0.39-14.5)	3.70 (1.02-17.5)	4.05 (1.23-12.4)	0.401
SIRI, median (min-max)	1,650.2 (449-10,015)	1,805.3 (545-10,729)	2,140.6 (812-8,945)	0.457

*Fisher's exact test for categorical data; Kruskal-Wallis test for continuous variables. CRP: C-reactive protein, CAR: CRP/albumin ratio, NLR: Neutrophil-to-lymphocyte ratio, SII: Systemic immune inflammation index, SIRI: Systemic inflammatory response index